

NUEVO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencias
CICOTOX: 0800-1-3040
EsSalud en Línea: 4118000 (Opción 4)

BOTRIZIM® 50 FW
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



QSI
QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Contenido neto: 0.25 L

Formulado por:
JIANSHI LANFENG BIOCHEMICAL CO. LTD
No. 3 Saha Road Xinyi Economic & Technological
Development Zone, Jiangsu, China

Importado y Distribuido por:
QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Tel.: 710-4000

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.
BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS	PC días	LMR BPHW
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cañolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium rolfsii</i>	200-250	20	2
Frijol	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	2
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	10
Mancano	Oidio	<i>Ascochyta blight</i>	200-250	20	5
Melocotonero	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200-250	20	5
Naranja	Botrytis en flor	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	10
Narajo	Pudrición del fruto	<i>Pericillium spp.</i>	200-250	20	10
Papa	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200-250	20	3
Plátano	Podredumbre corona	<i>Gibberesporium musarum</i>	200-250	20	5
Sandía	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200-250	20	0.5
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	5
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	5
Zapallo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	0.5
Zarzaparrillo	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200-250	20	0.5
Alcachofa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	0.1
Pimiento	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	0.1
Prunelo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	20	14
Maní	Podredumbre del tallo	<i>Phoma exigua</i>	350-350	30	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Algodón	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	4 mL/Ag de semilla	—
Arroz	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 mL/Ag de semilla	—
Espárrago	Pudrición coronas	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL / 40 mL	N/A
Guadua	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL / 40 mL	—
Maíz	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 mL / 20 mL	—

P.C.: Partido de Cereales, I.M.R. Límite Máximo de Residuo

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

