

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
CETOX: 0800-719111
EsSalud: 411-8000 (Opción 4)

BOTRIZIM[®] 50 FW
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Carbendazim 500 g/l.
Aditivos c.s.p. 1L

PUQA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
ARYSTA LIFESCENCE BENELUX S.P.R.L.
Rue de Renoy 20/1, B-4102
Ougrée, Bélgica.

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Tel.: 710-4000

Contenido Neto: 0.25 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de BOTRIZIM[®] 50 FW llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.
BOTRIZIM[®] 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	200	20	2
Frijol	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	2
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20	10
Mancano	Ordozia	Pectophora fusicaulis	200	20	5
Melocotonero	Ordozia	Sphaerotheca pannosa	200	20	5
Narajo	Botrytis en flores	Botrytis cinerea	200	20	10
Naranja	Pudrición del fruto	Phytophthora spp.	200	20	10
	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200	20	3
Plátano	Podredumbre corona	Gloeosporium musanum	200	20	5
Sandía	Ordozia	Erysiphe cichoracearum	200	20	0.5
Tomate	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20	5
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	5
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20	0.5
Zapallo	Ordozia	Erysiphe cichoracearum	200	20	0.5
	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	0.1
Pimiento	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	0.1
Pequeño	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	0.1
Mango	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20	0.1
Papa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20	14
Quinua	Podredumbre naran del tallo	Phoma oryzae	350	35	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Algodón	Fusariosis	Fusarium oxysporum	4 ml/kg de semilla	—
Espárrago	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	4 ml/kg de semilla	—
	Pudrición coronas	Fusarium oxysporum	400 ml	40 ml
Gladiolo	Fusariosis	Fusarium oxysporum	400 ml	40 ml
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200 ml	20 ml

P.C.: Período de Curación LMR: Límite Máximo de Residuo N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

