

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Benzimidazoles**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al Médico:** No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia**  
CETOX: 0800-719111  
EsSalud: 411-8000 (Opción 4)

# BOTRIZIM<sup>®</sup> 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:  
Carbendazim ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**PQUA N° 1649-SENASA**

Titular del Registro:



Formulado por:  
HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.  
Hockley House, 31 Longspan Road, Ashbrook  
Office Park, Manchester M22 5 LB,  
United Kingdom

Importado y Distribuido por:  
SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577,  
La Victoria, Lima-Perú  
Tel.: 710-4000

Contenido Neto: 0.25 L  
Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Para la preparación de **BOTRIZIM<sup>®</sup> 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.  
**BOTRIZIM<sup>®</sup> 50 FW** puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS ML/gal. (ppm)	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200	20	2
Frijol	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	2
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
Mancano	Oídiosa	<i>Podaglyphis leucotricha</i>	200	20	5
Melocotonero	Oídiosa	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200	20	5
Naranja	Botrytis sin flores	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
Naranja	Pudrición del fruto	<i>Phytophthora spp.</i>	200	20	10
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200	20	3
Plátano	Podredumbre corona	<i>Gloeosporium musarum</i>	200	20	5
Sandía	Oídiosa	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.5
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Zanajo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.5
Zanajo	Oídiosa	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.1
Alcachofa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Pimiento	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Pluvinio	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	14
Mango	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Papa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	14
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	<i>Phoma svayana</i>	350	35	30

**COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA**

Algodón	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	4 ml/g de semilla	—
Algodón	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 ml/g de semilla	—
Espárrago	Pudrición coronaria	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 ml	N.A.
Gladiolo	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 ml	—
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 ml, 20 mL	—

P.C.: Período de Curación; LMR: Límite Máximo de Residuo. N.A.: No aplica

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.