

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Bencimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencias

CICOTOX: 0800-1-3040

EsSalud en Línea: 4118000 (Opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



BOTRIZIM[®] 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro:



QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



Contenido neto: 0.5 L

Formulado por:

ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX S.P.R.L.
Rue de Renory 26/1, B-4102
Ougrée, Bélgica.

Importado y Distribuido por:

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOTRIZIM[®] 50 FW es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas y raíces, y se trasloca en sentido acropétalo dentro de la planta.

Para la preparación de **BOTRIZIM[®] 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

BOTRIZIM[®] 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS ml/cv. 38L	PC dias	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200		0.1
Frijol	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.5
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.5
Manzano	Oidio	<i>Podosphaera leucotricha</i>	200		3.0
Melocotonero	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200		2.0
Naranja	Botrytis en flores	<i>Botrytis cinerea</i>	200		1.0
	Pudrición del fruto	<i>Penicillium digitatum</i>	200		1.0
Papa	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200	1	0.1
Plátano	Podredumbre corona	<i>Gloeosporium musarum</i>	200		0.2
Sandía	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200		0.1
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.5
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		3.0
Zapallo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.5
	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200		0.5
Aicachafo	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.1
Pimiento	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.1
Pepino	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		0.1
Mango	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200		5.0
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	14	0.1
Quínoa	Podredumbre marrón del tallo	<i>Phoma exigua</i>	350	30	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

CULTIVO	Enfermedad	Fungicida	Dosis	PC	LMR
Algodón	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	4 mL/kg de semilla		—
	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 mL/kg de semilla	N/A	—
Espárrago	Pudrición coronas	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL		—
Gladíolo	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL		—
Papa	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 mL		—

PC.: Período de Carenacia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BOTRIZIM[®] 50 FW** al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean apropiadas para la aparición de la infección. Realizar como máximo (1) una aplicación por campaña/año.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

