

“LEACUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD
Room 10-6, Shidai Square N°8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4068

Contenido Neto: 0.5 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOTRIZIM® 50 FW es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas y raíces de las plantas, y se transloca en sentido acropétalo dentro de la planta.

BOTRIZIM® 50 FW es eficaz en el control de un amplio rango de enfermedades fungosas tales como, botrytis, oidiosis, rhizoctoniasis, podredumbre gris y blanca en diversos cultivos.

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		Dosis (g/Litro de agua)	Intervalo entre aplicaciones en días	LMR en mg/kg
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre basal	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200	20	2
Frijol	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	2
Mandarín	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
Naranja	Oidiosis	<i>Erysiphe leucostoma</i>	200	20	5
Maíz	Oidiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200	20	5
Naranja	Botrytis en flores	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
	Pudrición del fruto	<i>Penicillium spp.</i>	200	20	10
Papa	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200	20	3
Plátano	Podredumbre corona	<i>Gloeosporium musarum</i>	200	20	5
Sandía	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.5
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Zapallo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.5
	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.5
Alcachofa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Pimiento	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Piquillo	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Mango	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	14
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	<i>Phoma exigua</i>	350	35	30

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Algodón	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	4 mL/g de semilla	N.A.	—
	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 mL/g de semilla		
Espárrago	Pudrición coronas	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL	40 mL	—
	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL		
Gladiolo	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 mL	40 mL	—
	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 mL		

PC: Periodo de Carenacia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos. **N.A.:** No aplica.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Etiqueta: **BOTRIZIM50 WP x 0.5 L** (Ningbo Generic)

Fecha: 30-11-2021

Producto Cian Producto Amarillo Pant. 293 C
Producto Magenta Producto Negro

Medida : 11.5 x 23 cm
Material: Couche brillante de 115 grs.

CMYK

