

“LEACUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
SERFI: (01) 710-4068

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



# BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Carbendazim ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

PQA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



**Formulado por:**  
JIANGSU LANFENG BIOCHEMICAL CO. LTD.  
Suhua Road, Xinyi Economic & Technological Zone,  
Xinyi, Jiangsu, China

**Importado y Distribuido por:**  
SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4068

**Contenido Neto: 0.5 L**

**Lote N°:**

**Fecha de Form.:**

**Fecha de Venc.:**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BOTRIZIM® 50 FW** es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas y raíces de las plantas, y se transloca en sentido acropétalo dentro de la planta.

**BOTRIZIM® 50 FW** es eficaz en el control de un amplio rango de enfermedades fungosas tales como, botrytis, oidiosis, rhizoctoniasis, podredumbre gris y blanca en diversos cultivos.

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

**BOTRIZIM® 50 FW** puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVOS   | NOMBRE DE LA ENFERMEDAD      |                               | Dosis<br>(g/Litro de agua) | Frecuencia<br>(días) | LMR<br>(mg/kg) |      |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------|
|            | Nombre Común                 | Nombre Científico             |                            |                      |                |      |
| Cebolla    | Podredumbre basal            | <i>Sclerotium cepivorum</i>   | 200                        | 20                   | 2              |      |
| Frijol     | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 2              |      |
| Mandarín   | Podredumbre gris             | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 10             |      |
| Naranja    | Oidiosis                     | <i>Erysipha leucorhiza</i>    | 200                        | 20                   | 5              |      |
| Maíz dulce | Oidiosis                     | <i>Sphaerotheca pannosa</i>   | 200                        | 20                   | 5              |      |
| Naranja    | Botrytis en flores           | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 10             |      |
|            | Pudrición del fruto          | <i>Penicillium spp.</i>       | 200                        | 20                   | 10             |      |
| Papa       | Rhizoctoniasis               | <i>Rhizoctonia solani</i>     | 200                        | 20                   | 3              |      |
| Plátano    | Podredumbre corona           | <i>Gloeosporium musarum</i>   | 200                        | 20                   | 5              |      |
| Sandía     | Oidiosis                     | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 200                        | 20                   | 0.5            |      |
| Tomate     | Podredumbre gris             | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 5              |      |
| Vid        | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 5              |      |
| Zapallo    | Podredumbre gris             | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 0.5            |      |
|            | Oidiosis                     | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 200                        | 20                   | 0.5            |      |
| Alcachofa  | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 0.1            |      |
| Pimiento   | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 0.1            |      |
| Piquillo   | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 0.1            |      |
| Mango      | Botrytis                     | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 0.1            |      |
| Palto      | Podredumbre gris             | <i>Botrytis cinerea</i>       | 200                        | 20                   | 14             | 0.1  |
| Quinua     | Podredumbre marrón del tallo | <i>Phoma exigua</i>           | 350                        | 35                   | 30             | 0.01 |

**COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA**

|           |                   |                           |                   |       |   |
|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------|---|
| Algodón   | Fusariosis        | <i>Fusarium oxysporum</i> | 4 mL/g de semilla | N.A.  | — |
|           | Rhizoctoniasis    | <i>Rhizoctonia solani</i> | 4 mL/g de semilla |       |   |
| Espárrago | Pudrición coronas | <i>Fusarium oxysporum</i> | 400 mL            | 40 mL | — |
|           | Fusariosis        | <i>Fusarium oxysporum</i> | 400 mL            |       |   |
| Papa      | Rhizoctoniasis    | <i>Rhizoctonia solani</i> | 200 mL            | 20 mL | — |

PC: Periodo de Carenacia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A.: No aplica.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Etiqueta: **BOTRIZIM50 WP x 0.5 L** (Jiangsu)

Fecha: 30-11-2021

Producto Cian      Producto Amarillo      Pant. 293 C  
Producto Magenta      Producto Negro

Medida : 11.5 x 23 cm  
Material: Couche brillante de 115 grs.

CMYK

