**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico: Benzimidazoles**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al Médico:** No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**SAMU: 106**
**SERFI: (01) 710-4068**

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# BOTRIZIM® 50 FW

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Carbendazim ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**PQUA Nº 1649-SENASA**

**Titular del Registro:**

Serfi

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

**Formulado por:**
**HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.**
Hockley House, 3 Longstone Road Ashbrook
Office Park, Manchester M22 5 LB.
United Kingdom.

**Importado y Distribuido por:**
**SERFI S.A.**
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4068

**Contenido Neto: 1 L**
**Lote N°:**
**Fecha de Form.:**
**Fecha de Venc.:**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BOTRIZIM® 50 FW** es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas y raíces de las plantas, y se transloca en sentido acropétalo dentro de la planta.
**BOTRIZIM® 50 FW** es eficaz en el control de un amplio rango de enfermedades fungosas tales como, botrytis, oidiosis, rhizoctoniasis, podredumbre gris y blanca en diversos cultivos.

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.
**BOTRIZIM® 50 FW** puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS | NOMBRE DE LA ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC días | LMR ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | mL/ cil. 200 L | mL/moch.20 L | | |
| Cebolla | Podredumbre blanca | *Sclerotium cepivorum* | 200 | 20 | | 2 |
| Frijol | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 2 |
| Mandarina | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 10 |
| Manzano | Oidiosis | *Podosphaera leucotricha* | 200 | 20 | | 5 |
| Melocotonero | Oidiosis | *Sphaerotheca pannosa* | 200 | 20 | | 5 |
| Naranjo | Botrytis en flores | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 10 |
| | Pudrición del fruto | *Penicillium spp.* | 200 | 20 | | 10 |
| Papa | Rhizoctoniasis | *Rhizoctonia solani* | 200 | 20 | | 3 |
| Plátano | Podredumbre corona | *Gloeosporium musarum* | 200 | 20 | | 5 |
| Sandía | Oidiosis | *Erysiphe cichoracearum* | 200 | 20 | | 0.5 |
| Tomate | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 5 |
| Vid | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 5 |
| Zapallo | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 0.5 |
| | Oidiosis | *Erysiphe cichoracearum* | 200 | 20 | | 0.5 |
| Alcachofa | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 0.1 |
| Pimiento Pigüello | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 0.1 |
| Mango | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | | 0.1 |
| Palto | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 20 | 14 | 0.1 |
| Quinua | Podredumbre marrón del tallo | *Phoma exigua* | 350 | 35 | 30 | 0.01 |

### COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Fusariosis | *Fusarium oxysporum* | 4 mL/kg de semilla | | N.A. | – |
| | Rhizoctoniasis | *Rhizoctonia solani* | 4 mL/kg de semilla | | | – |
| Espárrago | Pudrición coronas | *Fusarium oxysporum* | 400 mL | 40 mL | | – |
| Gladiolo | Fusariosis | *Fusarium oxysporum* | 400 mL | 40 mL | | – |
| Papa | Rhizoctoniasis | *Rhizoctonia solani* | 200 mL | 20 mL | | – |

**PC:** Período de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos. **N.A.:** No aplica.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BOTRIZIM® 50 FW** al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean apropiadas para la aparición de la infección. Realizar como máximo (1) una aplicación por campaña/año.

### PERÍODO DE REINGRESO

Después de 12 horas de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

**BOTRIZIM® 50 FW** puede mezclarse con otros fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, foliares, reguladores de crecimiento y hormonas; salvo los productos cúpricos y los de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

ESPEJO'S GRAF S.A.C.
GRÁFICA INTEGRAL

Etiqueta: **BOTRIZIM 50 WP x 1 L** (Hockley)
**Fecha:** 30-11-2021

Producto Cian
Producto Amarillo
Pant. 293 C
Producto Magenta
Producto Negro

Medida : 14.5 x 29.1 cm
Material: Couche brillante de 115 grs.

CMYK

Serfi