

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD
Room 10-6, Shidai Square N°8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4068

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOTRIZIM® 50 FW es un fungicida sistémico que tiene efecto preventivo y curativo. Es absorbido a través de las hojas y raíces de las plantas, y se transloca en sentido acropétalo dentro de la planta.

BOTRIZIM® 50 FW es eficaz en el control de un amplio rango de enfermedades fungosas tales como, botrytis, oidiosis, rhizoctoniasis, podredumbre gris y blanca en diversos cultivos.

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/cil. 200 L	mL/moch.20 L		
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	200	20		2
Frijol	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		2
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20		10
Manzano	Oidiosis	Podosphaera leucotricha	200	20		5
Melocotonero	Oidiosis	Sphaerotheca pannosa	200	20		5
Naranja	Botrytis en flores	Botrytis cinerea	200	20		10
	Podrición del fruto	Penicillium spp.	200	20		10
Papa	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	200	20		3
Plátano	Podredumbre corona	Gloeosporium musarum	200	20		5
Sandia	Oidiosis	Erysiphe cichoracearum	200	20		0.5
Tomate	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20		5
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		5
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20		0.5
	Oidiosis	Erysiphe cichoracearum	200	20		0.5
Zucchini	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		0.1
Pimiento	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		0.1
Pimiento	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		0.1
Maíz	Botrytis	Botrytis cinerea	200	20		0.1
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	20	14	0.1
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	Phoma exigua	350	35	30	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Algodón	Fusariosis	Fusarium oxysporum	4 mL/kg de semilla			—
	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	4 mL/kg de semilla			—
Espárrago	Podrición coronas	Fusarium oxysporum	400 mL	40 mL	N.A.	—
	Fusariosis	Fusarium oxysporum	400 mL	40 mL		—
Papa	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	200 mL	20 mL		—

PC: Período de Carenacia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BOTRIZIM® 50 FW** al inicio de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean apropiadas para la aparición de la infección. Realizar como máximo (1) una aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

Después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

BOTRIZIM® 50 FW puede mezclarse con otros fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, foliares, reguladores de crecimiento y hormonas; salvo los productos cúpricos y los de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Etiqueta: **BOTRIZIM 50 WP x 1 L** (Ningbo Generic)

Fecha: 30-11-2021

Producto Cian Producto Amarillo Pant. 293 C
Producto Magenta Producto Negro

Medida : 14.5 x 29.1 cm
Material: Couche brillante de 115 grs.

CMYK

