

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ∞ No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - ∞ Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - ∞ No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - ∞ Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - ∞ Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - ∞ Mézclese, almacénese o aplíquese este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico, no en recipientes de acero o acero sin revestimiento.
- Este producto o las soluciones de este producto reaccionan en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuente cercana de fuego.

PRIMEROS AUXILIOS:

- ∞ Grupo Químico: Inhibidores de la síntesis de aminoácidos.
- ∞ En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- ∞ En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica para los ojos.

ANTÍDOTO:

No tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- ∞ Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- ∞ Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- ∞ Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

En condiciones normales de uso, **DESTRUCTOR** no es tóxico para vertebrados e invertebrados, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

Destructor®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN

Glyphosate.....480 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro N° 067-96-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A.

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China.

Telf: +86-531-8875230 Fax: +86-531-8875230

Lote:

Contenido Neto: **200L**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **DESTRUCTOR** es un herbicida post-emergente, no selectivo y sistémico para el control de la mayoría de malezas de hoja ancha y gramíneas, tanto anuales, como perennes.

Evítese el contacto con las hojas y partes verdes del tallo del cultivo a tratar, a fin de no ocasionar fitotoxicidad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua limpia, el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **DESTRUCTOR** recomendado agitando bien y completar luego con mas agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LAS MALEZAS		DOSIS l/ha			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	Malezas anuales	Malezas perennes	L/Cil. 200 L		
Citricos						15	0.5
Manzano						15	0.2
Café	Gramalote Kikuyo	<i>Panicum purpurascens</i> <i>Pennisetum polystachion</i>	2 a 3	4 a 6	-	15	1.0
Plátano	Verdolaga Gramma china	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sorghum halepense</i>				15	0.2
Control total de malezas (bordes, caminos, acequias),						n.a.	n.a.
Caña de azúcar.						30	2.0
Espárrago	Yuyo Rabo de zorro Amor seco Coquito Gramma dulce	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i>	3	3	-	No disponible	0.1
Alcachofa	Verdolaga Rabo de zorro	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i>	3.75 - 5	3.75 - 5			0.2
Palto	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0	-	No disponible	0.1
Mango	Gramma china Coquito	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i>					
Pimiento (Paprika)	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	3.0 - 4.0	3.0 - 4.0			
Granado	Yuyo Verdolaga Gramma dulce Coquito	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cyperus rotundus</i>	3	3	-	No disponible	0.1
Vid	Coquito Pega pega Verdolaga Yuyo Pata de gallina Amor seco	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i>	-	-	2 - 3	14	0.5
Palma Aceitera	Pega pega Coquito	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cyperus rotundus</i>	4 - 5	4 - 5	-	No disponible	0.1

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se debe aplicar cuando las malezas perennes tengan 4 a 8 hojas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Puede ser aplicado con otros herbicidas para aumentar su espectro de control, realizar una prueba de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD: **DESTRUCTOR** no presenta efectos fitotóxicos si se aplica en los cultivos, forma y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

