

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Astrobilurinas+Triazoles**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfonos de emergencia:**  
**ESSALUD:** 4118000 Anexo 4  
**Infosalud:** 0800-10-828  
**CICOTOX:** 0800-1-3040, 3287700

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

# EVITO® T

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Fluoxastrobin.....125 g/l  
 Tebuconazole.....325 g/l  
 Aditivos .....c.s.p. 1.00 L

**PQUA N° 1864 - SENASA**

**Titular del Registro:**  
**ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**  
 Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
 Jesús María - Lima - Perú



**Formulado por:**

**Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A.**  
 Salto de Pirapora / SP - Rod. Sorocaba - Pilar do Sul  
 km 122 - CEP 18160-000 - Brasil

**Importado y Distribuido por:**  
**QSI PERU S.A.**  
 Av. República de Panamá 2577  
 La Victoria - Lima - Perú  
 Telf. 710-4000



N° de Lote:  
 F. de Form.:  
 F. de Venc.:  
 Contenido neto: 4 L

@EVITO es Marca Registrada de Arysta LifeScience

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Es un fungicida sistémico de amplio espectro de acción preventiva y curativa.

El producto **EVITO® T** es una mezcla de dos fungicidas: Fluoxastrobin y Tebuconazole. Fluoxastrobin y Tebuconazole se complementan eficientemente en el control de hongos fitopatógenos. El Fluoxastrobin actúa sobre la germinación de la espora y el crecimiento del micelio de los hongos, inhibiendo la respiración mitocondrial. El Tebuconazole inhibe la biosíntesis del ergosterol, impidiendo así la multiplicación del hongo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Maiz	Mancha negra del maiz	<i>Phyllachora maydis</i>	0.4-0.6	-	36	0.05 <sup>A</sup>
	Mancha de la hoja	<i>Helminthosporium turcicum</i>				0.02 <sup>B</sup>
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.3-0.5	-	35	1.5 <sup>A</sup> 0.05 <sup>B</sup>
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.3	35	0.02 <sup>A</sup> 0.1 <sup>B</sup>
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.20-0.25	24	1.5 <sup>A</sup> 1.9 <sup>B</sup>

A:Tebuconazole B: Fluoxastrobin

L.M.R.: Límite máximo de residuos P.C. Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la enfermedad en las plantas del campo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña en maíz y arroz. Usar la dosis mayor cuando la presión de la enfermedad es alta, con intervalo mínimo de frecuencia de 7-12 días entre aplicaciones. El mojamiento recomendado en el cultivo de arroz es de 200 litros de agua por hectárea. En los cultivos de papa y arándano, realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos de reacción altamente alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

