

12,0 ± 0,3

Timerole Xtra

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Granulo Dispersable (WG)

Composición:
 Thiamethoxam 750 gr/kg
 Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° xxx-SENASA
 Titular de Registro :
 Rainbow Agrosoluciones S.A.C. 

Formulado por: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
 6th Floor, Gaoxixijishuchuangye Centre Shunhua Road 750#,
 Jinan, Shandong-China

Importado por: RAINBOW AGROSOLUCIONES S.A.C.
 Av. el Polo 401, oficina 610,
 Santiago de Surco - Lima

Contenido Neto: 100 gr
 N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

16,0 ± 0,3

2,4

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de contacto. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Use ropas protectoras durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, motores, bebidas o forros.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
 Dispersión: Inofensiva.

- En caso de ingestión: no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Indicar al médico bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el empolvamiento es por o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar ventilado. Si no respira, hacer respiración boca a boca. Si la respiración es muy difícil, administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- Nota: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESALUD: 800-10200 (Línea gratuita)
COTACOT: 0-800-1-9000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tome precauciones y atropellos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en cercanías de poblaciones, escuelas en el cultivo o tratar o cultivos silvestres.
- No aplicar a la vez que se siembran o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Aplicar temprano en los mañaneros o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a las agencias de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Reservar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir errantes en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar el deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Timerole Xtra es un producto con ingrediente activo Thiamethoxam, es un insecticida perteneciente al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y de contacto, absorbido rápidamente y transportado a toda la planta donde actúa por interferencia de la transmisión nerviosa entre neurones al unirse a receptores nicotínicos de acetilcolina, impidiendo la alimentación de los insectos y ocasionando su posterior muerte.
- Timerole Xtra puede ser aplicado con pulverizadores manuales de jeringas (mochilas), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		Dosis (gr/kg)	Apl.	Lote
	Alarido	Alarido controlado			
Maíz	Alarido	Alarido controlado	1.00-1.50	10	1.00

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar Timerole Xtra dirigido al follaje del cultivo, cuando este se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables, para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo, considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropas de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Timerole Xtra es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

- Timerole Xtra no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.