

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazolinone.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- **TELEFONOS DE EMERGENCIA:**
CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- Ver Hoja informativa adjunta.



ADAMA

Moonlight®
350 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Imazapic 262.5 g/L
Imazapyr 87.5 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX- SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: **500 ml**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Moonlight 350 SL es un herbicida pre-emergente de prolongado efecto residual que brinda un excelente control en malezas de difícil manejo. Aplicar con equipo de pulverización terrestre dirigido al suelo, en las zonas donde se desee controlar las malezas, emplear suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura. El suelo debe haber sido adecuadamente preparado, libre de terrones, y tener suficiente humedad al momento de aplicar el producto. Ajustar el pH del caldo de aplicación a 5,5 - 6.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Caña de azúcar	<i>Ipomoea quinquefolia</i> "Carrehuela", <i>Ricinus communis</i> "Hiquerilla", <i>Trianthema portulacastrum</i> "Verdolagón", <i>Luffa operculata</i> "Luffa", <i>Euphorbia heterophylla</i> "Lechera", <i>Heliotropium curassavicum</i> "Litro", <i>Cyperus rotundus</i> "Coquito", <i>Rottboelia cochinchinensis</i> "Caminadora", <i>Echinochloa colona</i> "Cebadilla", <i>Setaria verticillata</i> "Pega pega".	0.5 - 0.6	N.A.	0.01 ¹ 0.01 ²
Palma Aceitera	<i>Cyperus rotundus</i> "coquito", <i>Pueraria phaseoloides</i> "kudzú", <i>Mimosa pudica</i> "verganzosa", <i>Phyllanthus niruri</i> "characa piedra", <i>Commelina</i> sp. "ushpica", <i>Axonopus compressus</i> "torourco", <i>Brachiaria decumbens</i> "brachiaría".	0.5	7	0.01 ¹ 0.01 ²

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carenia

N.A.: No aplicable. ¹Imazapic/²Imazapyr

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número de aplicaciones por campaña y año: Una (01).

Momento de aplicación

Caña de azúcar (soca): Luego del corte, antes de la emergencia del cultivo y malezas.

Palma aceitera: Antes de la emergencia de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja informativa.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones : 230 mm x 120 mm

Nota: Esta etiqueta requiere hoja informativa