

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazolinone.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **TELEFONOS DE EMERGENCIA:**
CISPROQUIM 080:050-847; CICOTOX 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01)641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto cuando haya probabilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de desecharlos en un lugar autorizado.

ADAMA

Moonlight®
350 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Imazapic 262.5 g/L
Imazapyr 87.5 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Interior
Zona Franca Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: **200 Litros**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Moonlight 350 SL es un herbicida pre-emergente de prolongado efecto residual que brinda un excelente control en malezas de difícil manejo. El cese de crecimiento ocurre poco después del tratamiento, mientras que los signos de muerte serán evidentes algunas semanas después de la aplicación. Aplicar con equipo de pulverización terrestre dirigido al suelo, en las zonas donde se desee controlar las malezas, emplear suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura. El suelo debe haber sido adecuadamente preparado, libre de terrones, y tener suficiente humedad al momento de aplicar el producto. Ajustar el pH del caldo de aplicación a 5.5 - 6.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Caña de azúcar	<i>Ipomoea quinquefolia</i> "Carrehuela", <i>Ricinus communis</i> "Higuierilla", <i>Trianthema portulacastrum</i> "Verdolagón", <i>Luffa operculata</i> "Luffa", <i>Euphorbia heterophylla</i> "Lechera", <i>Heliotropium curassavicum</i> "Litro", <i>Cyperus rotundus</i> "Coquito", <i>Rottboelia cochinchinensis</i> "Caminadora", <i>Echinochloa colona</i> "Cebadilla", <i>Setaria verticillata</i> "Pega pega".	0.5 - 0.6	N.A.	0.01 ¹
	0.01 ²			
Palma Aceitera	<i>Cyperus rotundus</i> "coquito", <i>Pueraria phaseoloides</i> "kudzú", <i>Mimosa pudica</i> "vergonzosa", <i>Phyllanthus niruri</i> "chanca piedra", <i>Commelina</i> sp. "ushpica", <i>Axonopus compressus</i> "torauco", <i>Brachiaria decumbens</i> "brachiaria".	0.5	7	0.01 ¹ 0.01 ²

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia
N.A.: No aplicable. ¹Imazapic/²Imazapyr

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número de aplicaciones por campaña y año : Una (01).

Momento de aplicación

Caña de azúcar (soca): Luego del corte, antes de la emergencia del cultivo y malezas.

Palma aceitera: Antes de la emergencia de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros herbicidas de uso común, sin embargo se recomienda hacer una prueba previa en pequeña escala para determinar la compatibilidad física de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD

No presenta efectos fitotóxicos sobre el cultivo cuando se usa a las dosis y condiciones aquí recomendadas. Deberá haber transcurrido 26 meses entre la última aplicación de Moonlight 350 SL y la siembra de un cultivo distinto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 330 mm x 200 mm