"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# CAMPO - FIPRO 200 SC

# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

# Composición:

Fipronil	200 g/L
Aditivos	cen 1 I

# Reg. PQUA N° 1883 - SENASA

# Titular del Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru Teléfono: +51-1-222-2795



#### Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6. Shidai Square, N° 8. Lengling Street, Ningbo 315010.

Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: +86-574-87301088

#### Importador v Distribuidor: AGROPECUARIA CHIMU S. R. L.

Av. César Vallejo N° 220 – Urb. Palermo - Trujillo- La Libertad- Pe

Teléfono: + 51 - 44 - 203962

## Nº de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** 

Contenido neto : 200 L

NO INFLAMABLE

**DAÑINO** 



Agropecuaria Chimú

**NO EXPLOSIVO** 



### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del
- Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugarfresco
- y seco. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y iabón; y lave la rona contaminada senarada de la rona de casa
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar. alimentos o aqua para consumo.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fenilpyrazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico v muestrele la etiqueta v la hoja informativa.
- Solo si el paciente está conciente provocar el vomito, asegurando las vías respiratorias,
- tratamiento con carbón activado podría sustituir al lavado gástrico. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y,
- si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, con atención médica requerida.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial. No existe antidoto especifico. El tratamiento será sintomático.
- Carbon Activado: la dosis recomendada es de 25 100 gr en adultos/adolescentes y de 25-50 grenniños (1 a 11) y de 1 gr/kg en infantes menores de 1 año.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

# CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y
- vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano por las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques ó arrovos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - FIPRO 200 SC es un insecticida de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen

CAMPO - FIPRO 200 SC se emplea diluido en agua; preparar una premezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de

CAMPO - FIPRO 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palança o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

#### Consulte con un ingeniero agrónomo

	Pla				
Cultivo	Nombre común	Nombre Científico	Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
Esparrago	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis Iongifila	0.500	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones optimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de CAMPO - FIPRO 200 SC dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

CAMPO - FIPRO 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.





























