30.0 cm

2.0 cm

15.0 cm

" LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañése con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua para el consumo.

PRIMEROS AUXILIOS.
- Grupo químico: TRIAZINAS
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está conciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial necesario.

- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 o CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en los sitos destinados por las autoridades locales para este fin.

QUIOUT 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN
Ametrina ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1870 - SENASA

Titular de Registro:
AGROW SAC
Calle Los Aperos Mz. "O" Lt. 1. Urb. Las Viñas de La Molina - Lima
Teléfono: 998128710

Formulador:
KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED
Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong-China.

Importador y Distribuidor:

AGROW

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Adicionar **QUIOUT 500 SC**, según dosis recomendada en el equipo de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente lograr una mezcla homogénea.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	*Eleusine indica*	2-3	45	0.05
	Rabo de zorro	*Setaria verticillata*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Capuli cimarrón	*Nicandra physaloides*			
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*			
	Hierba de gallinazo	*Chenopodium murale*			

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
-Aplicar al detectar las primeras infestaciones, es decir, en post emergencia temprana de las malezas. Se recomienda realizar una aplicación / campaña / año.

PERIODO DE REINGRESO
- No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
-**QUIOUT 500 SC** es compatible con la mayoría de herbicidas.

FITOTOXICIDAD
- No es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO