

18.0 +/- 0.3 cm

26.0 +/- 0.3 cm

3.9 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

AKRON[®]
500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Acetamiprid : 250 g/kg

Buprofezin : 250 g/kg

Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1066 - SENASA

Silvestre

Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg
N° de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
No.58 Shuangxiang Road, Hongshan
Fine-Chemical Zone, Nanjing 211511.
China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo Químico:** Acetamiprid: **Neonicotinoide**; Buprofezin: **Thiadiazine**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AKRON[®] 500 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Acetamiprid actúa por contacto e ingestión, es translaminar y sistémico; trabaja como un análogo de acetilcolina, la cual produce una excitación nerviosa que provoca la muerte del insecto. Buprofezin es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Inhibidor de síntesis de quitina, afectando el proceso de la muda que provoca la muerte del insecto.
AKRON[®] 500 WG se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el cultivo de pimiento se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. Para los cultivos de arándano, arroz, espárrago, granado, mandarina, palto, melocotonero y vid se recomienda 01 aplicación por campaña/plaga, considerando 01 campaña al año, previa evaluación de la población de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: **AKRON[®] 500 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y con productos alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	kg/ha		
ARÁNDANO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 200	-	78	2.0 (a) 0.01 (b)
	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	150 - 200	-	78	2.0 (a) 0.01 (b)
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Sogatodes orizicolus</i>	150 - 200	-	7	0.01 (a) 0.5 (b)
ESPÁRRAGO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 200	-	14	0.8 (a) 0.01 (b)
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	80 - 100	-		
GRANADO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	100 - 150	-	90	0.01 (a) 0.05 (b)
MANDARINA	Piojo blanco de los cítricos	<i>Pinnaspis aspidistrae</i>	150 - 200	-	7	1.0 (a) 0.6 (b)
MELOCOTONERO	Piojo blanco	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	100 - 150	-	14	0.70 (a) 9.00 (b)
PALTO	Queresa del palto	<i>Fiorinia florinae</i>	100	1.0	21	0.01 (a) 0.05 (b)
	Chinche	<i>Dagbertus peruanus</i>	100 - 200	-		
PIMIENTO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 200	0.3 - 0.6	7	0.05 (a) 0.2 (b)
VID	Chinches harinosos	<i>Pseudococcus viburni</i>	150 - 200	-	30	0.5 (a) 1.0 (b)

P.C.: Período de Carencia

(a)Acetamiprid (b) Buprofezin

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

