

		POLVO MOJABLE - WP FUNGICIDA AGRÍCOLA PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA 500 WP Bayax																			
Bayax 500 WP PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO mojable - WP Composición: Diethofencarb : 500 g/kg Aditivos : c.s.p.1kg Registro PQUA N° 1653 - SENASA Silvestre Protección Vegetal Titular de Registro: Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C. SILVESTRE PERÚ S.A.C. Calle Anca 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300 Contenido Neto: 1 kg (5 bolsas de 200 gramos c/u) Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD. 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA. F. de Form.: Nº Lote: F. de Venc.: NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO	LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN - Este producto es de cuidado. No ingerir. - Peligroso si es inhalado. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. PRIMEROS AUXILIOS Grupo Químico: Carbamato - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta. - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos. - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. - Antídoto: Tratamiento sintomático. TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 328 7700 ESSALUD: 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847	LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO BAYAX® 500 WP es un fungicida sistémico, de acción preventiva y curativa que actúa sobre las cepas resistentes de Botrytis a los benzimidazoles; ideal para un programa de rotación de modos de acción. BAYAX® 500 WP es fácilmente absorbido por las hojas y raíces trasladándose a otras partes de la planta de forma acropétala, de manera que evita la infección y actúa sobre el patógeno situado dentro de los tejidos, evitando la formación de los tubos germinativos, es decir, inhibe la mitosis. - Con objeto de prevenir resistencias y controlar las diferentes cepas de Botrytis, deberá aplicarse en mezcla o alternancia con productos con diferentes modo de acción. BAYAX® 500 WP se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecomas, parihuelas, etc) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" <table><tr><th rowspan="2">CULTIVO</th><th colspan="2">PLAGA</th><th colspan="2">DOSIS</th><th rowspan="2">PC (días)</th><th rowspan="2">LMR (ppm)</th></tr><tr><th>NOMBRE COMÚN</th><th>NOMBRE CIENTÍFICO</th><th>kg/200 L</th><th>kg/ha</th></tr><tr><td>MANDARINA</td><td>"Podredumbre gris"</td><td>Botrytis cinerea</td><td>0.2</td><td>1 - 2</td><td>35</td><td>0.05</td></tr></table> PC: Período de Cuarenta LMR: Límite Máximo de Residuos FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Se deberá evaluar la incidencia de la enfermedad y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de BAYAX® 500WP. Realizar una aplicación por campaña/año. PERIODO DE REINGRESO Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección. COMPATIBILIDAD BAYAX® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos fuertes, aguas con carbonatos y materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. FITOTOXICIDAD BAYAX® 500 WP no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. RESPONSABILIDAD CIVIL El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.	CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha	MANDARINA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.2	1 - 2	35	0.05	LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS - Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE - Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. - Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas. - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.
CULTIVO	PLAGA			DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)														
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha																	
MANDARINA	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.2	1 - 2	35	0.05															
LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO	</																				