Etiqueta MICROTHIOL SPECIAL 25K 21cm x 30cm STD 23.02.17

Microthiol® Special

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

COMPOSICIÓN

Azufre 800g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Registro N° 435 - 97 - AG - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos, LIMA - PERÚ
Telefono: 614 -1500; Fax: 614 - 1517

FARMAGRO SA
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
UNITED PHOSPHORUS LIMITED
Uniphos House, Madhu Park
11 th Rd., Khar (w)
Mumbai - 40005, India

Contenido Neto: **25k**
Lote:
Fecha de Formulación
Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**
NO INFLAMABLE

® Marca registrada por CEREXAGRI S.A.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ***Microthiol Special*** es un fungicida acaricida cuyo ingrediente activo es un azufre, que es un elemento químico no - metálico.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos, ni animales.
- Evitar en lo posible aplicaciones durante las horas de mayor calor y en periodo de sequía persistente. Tampoco recomendamos el uso del ***Microthiol Special*** durante los 15 días que preceden a un tratamiento de aceite mineral o en combinación con el mismo, por posibles quemaduras en el follaje.
- No comer, ni fumar durante la aplicación. Luego lavarse con agua y jabón.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- **No utilice este envase para conservar alimentos o agua.**

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Inorgánicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO:
No tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Es un excelente AZUFRE, con una instantánea mojabilidad, muy buena suspensión. Tiene excelente tamaño de partícula donde el 92% de la partícula está entre 1 a 6 micrones. Mantiene bajas las poblaciones de ácaros (arañitas rojas), por su efecto depresor contra ellos.

Verter directamente el ***Microthiol Special*** en el volumen de agua necesaria agitando la misma.

NOTA:
Microthiol Special por ser azufre tiene efecto depresor sobre Acaros (Arañita roja y Acaro hialino).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Microthiol Special debe aplicarse de manera preventiva cuando se presenten las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de las plagas.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre a las áreas tratadas durante las 4 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
No aplicar dentro de los 15 días que preceden a un tratamiento de aceite mineral o en combinación con el mismo.

FITOTOXICIDAD:
Microthiol Special no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta y si se siguen las recomendaciones de: evitar en lo posible aplicaciones durante las horas de mayor calor y periodo de sequía persistente.

NOTA:
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

DOSIS Y USOS:

Cultivo	ENFERMEDAD / PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200L Cilindro	g/20L Mochila		
Vid	Oidiosis	*Uncinula necator*	1	100	7	n.d.
Melocotón	Oidiosis	*Sphaerotheca spp.*	0.5 - 1	50 - 100		
Fresa	Oidiosis	*Sphaerotheca spp.*	0.5 - 1	50 - 100		
	Arañita roja	*Tetranychus spp.*	0.5 - 1	50 - 100		
Melón, Sandía	Oidiosis	*Erysiphe cichoracearum*	0.5 - 1	50 - 100		
Frijol, Vainita, Arveja	Oidiosis	*Erysiphe spp.*	0.5 - 1	50 - 100		
Mango	Oidiosis	*Oidium mangiferae*	1	100		
Papa	Acaro hialino	*Heminotarsonemus latus*	0.5 - 1	50 - 100		
Palto	Arañita roja	*Tetranychus spp.*	0.75 - 1	75 - 100		
Pimiento	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.5	50		
Pimiento	Acaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	1	100		
Alcachofa	Oidiosis	*Leveillula taurica*	1	100		
Rosa	Oidiosis	*Sphaerotheca pannosa*	1	100		
Mandarina	Acaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	1	100		
Palto	Arañita roja Arañita roja	*Tetranychus spp.* *Oligonychus punicae*	0.75 - 1 0.75 - 1	75 - 100 75 - 100	1	0.05
Granado	Arañita marrón	*Oligonychus punicae*	0.75 - 1	75 - 100	n.r	n.r

PC= Periodo de carencia n.d. = No disponible LMR = Límite máximo de residuos en ppm;

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO