



Mar. Lima - Perú. Teléfono: 501-1000
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del
DROKASA PERÚ S.A.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Parcela 64, Lt B, Lurigancho, Chosica, Lima
ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt B y Sub lote

Devepment Zone, Binjiang Hangzhou-China.
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech
KINGTAL CHEMICALS CO LTD.

FORMULADO POR:

Mar. Lima - Perú. Teléfono: 501-1000
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del
S.A.

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ

Capacidad	Material
100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg	Bolsas de aluminio trilmado

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

- Estado físico : Sólido
 - Color : Blanco
 - Olor : débil, característico
 - Densidad : 0,63-0,64 g/cm³ a 20°C
- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

YOKURO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA


ESTROBILURINA + TRIAZOLE
GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Reg. PQUA Nº 1650 - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Trifloxystrobin..... 250 g/kg
Tebuconazole..... 500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
methyl (E)-methoxyimino-((E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-
mtolyl)ethylideneaminoxy]tolyl)acetate;
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-
1-ylmethyl)pentan-3-ol

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: C₂₆H₂₇F₃N₃O₅; C₂₃H₂₂ClN₃O
PESO MOLECULAR : 408,4 ; 307,8

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
© Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Tebuconazole: Triazole; Trifloxystrobin: estrobilurina.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases:
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	%		
Pimiento	"Oidium"	Levellula taurica	0.250	-	7	0,5* 0,3**
Vid	"Oidiosis"	Erysiphe necator	0.300- 0.375	-	14	0,5* 3,0**
Arroz	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	0.20- 0.25	-	35	1,0* 5,0**
Papa	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.300- 0.350	-	14	0,02* 0,02**

INSTRUCCIONES DE USO
LMR: Límite máximo de residuos
*Tebuconazole**Trifloxystrobin
PC: Período de carencia
En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda utilizar **YOKURO** cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o en la etapa inicial de manifestación de la enfermedad. Se

recomienda 1 aplicación/campaña, hasta 2 campañas/año.

Mecanismo de acción: YOKURO esta compuesto de dos ingredientes activos Trifloxystrobin y Tebuconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Trifloxystrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y Tebuconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungos.

Modo de acción: YOKURO, es un fungicida preventivo y curativo. Con actividad sistémica, mesostémica, protectora y erradicante.

Compatibilidad: YOKURO es compatible con la mayoría de los productos agrícolas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: YOKURO, se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión

terrestre.

Equipo de aplicación y calibración: Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

COD. 618167

