# YOKURO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Trifloxystrobin..... 250 g/kg
Tebuconazole..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 1650 - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO:
**DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9,
Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

DUWEST DROKASA PERU

FORMULADO POR:
**KINGTAI CHEMICALS CO LTD.**
9F,Huarong Times Mansion Hi-Tech
Devepment Zone,Binjiang Hangzhou-China.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 100 g**

**Número de Lote :**
**Fecha de Formulación :**
**Fecha de Vencimiento :**

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evita almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo Químico:
Tebuconazole: Triazol; Trifloxystrobin: estrobilurina.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
CETOX: 0800-71911 ó 273-2318; celular 999-072933
ESSALUD: 0801-10200
DROKASA PERÚ S.A.: 501-1000

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**YOKURO**, es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Trifloxystrobin y Tebuconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Trifloxystrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el Tebuconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungosos.

En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
**YOKURO**, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**
**YOKURO**, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC días | LMR ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | kg/ha | % | | |
| Pimiento | "Oídium" | *Leveillula taurica* | 0.250 | - | 7 | 0.5* / 0.3** |
| Vid | "Oidiosis" | *Erysiphe necator* | 0.300 - 0.375 | - | 14 | 0.5* / 3.0** |
| Arroz | "Pyricularia" | *Pyricularia oryzae* | 0.20 - 0.25 | - | 35 | 1.0* / 5.0** |
| Papa | "Tizón temprano" | *Alternaria solani* | 0.300 - 0.350 | - | 14 | 0.02*/0.02** |
| Arándano | "Mancha negra de la hoja" | *Alternaria alternata* | - | 0.025 - 0.03 | 14 | 1.5* / 3.0** |

LMR: Límite máximo de residuos
PC: Periodo de carencia
* Tebuconazole / **Trifloxystrobin