

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Micro-organism derived
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / ESSALUD: 0801-10200  
INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS 2255951

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía de producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**BULLY® 12% SC**  
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC**

**Composición:**

Spinosad.....120.0 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

**Formulador:**

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750  
Jinan, Shandong, China +86-531-88875230

**Importado y distribuido por:**

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS  
Calle 21 N°713 Oficina 205  
San Isidro Lima - Perú  
Teléfono: (01) 225 5951  
www.ipeh.org.pe



Fecha de formulación :

N° Lote:

Contenido Neto: **1 L**

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada por IPEH

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BULLY 12% SC** es un insecticida con actividad de contacto e ingestión rápida en insectos. Produce excitación del sistema nervioso de los insectos, lo cual conduce a contracciones musculares involuntarias, postración con temblores y parálisis.

**BULLY 12% SC** se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Copitarsia corruda	<i>Copitarsia corruda</i>	0.2	1	0.02
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	1	2.00

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos / **ppm:** partes por millón

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda hacer dos aplicaciones como máximo por campaña, considerando un intervalo de 7 días, rotando con insecticidas de diferente modo de acción para evitar la ocurrencia de resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

