

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 24 horas siguientes a su aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Ciclo octano**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y corriente, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados queden abiertos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre, si es necesario dar respiración artificial.
- Antídoto: No posee antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MATASEC está formulado en cebo en granos lo que facilita su aplicación y distribución. El ingrediente activo posee un efecto atractivo y tiene una toxicidad evidente sobre Deroceras, actuando por contacto y por ingestión. **MATASEC** se aplica a mano o máquina, alrededor de la base de las plantas o en montoncitos distribuidos sobre la superficie afectada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El número máximo de aplicaciones es una aplicación por campaña, 2 campañas al año. Aplicar **MATASEC** sobre las zonas más visitadas por Deroceras, como zonas húmedas, cerca de paredes y malezas. Cuando se trata de un ataque detectado tardíamente y el cual se encuentra generalizado, las bandas del producto deben disponerse en el sentido de las hileras del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:

MATASEC, aunque es compatible con todos los plaguicidas de uso común, no debe mezclarse con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

MATASEC no ha provocado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada y siguiendo las indicaciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	“Babosa”	<i>Deroceras reticulatum</i>	4 - 6	NA	0.05

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
N.A.: No aplica.

P.C.: Periodo de carencia (días)



MATASEC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

MOLUSQUICIDA AGRÍCOLA

CEBO EN GRANOS – (GB)

Composición:

Metaldehyde.....50 g/Kg
Aditivosc.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

Softagro®

Formulado por:
SHARDA CROPChem LTD.
Dominic Holm, 29th Road,
Bandra (w) Mumbai – 4000050. India.
Teléfono: + 91 22 5678 2800
+ 91 22 5678 2828 / + 91 22 5678 2808

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf.: (01) 336-8645, Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 5 Kg

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO