

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es dañino, no ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazol
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

o CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)
o ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o CISPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el aérea tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

DIFREE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Difenoconazole..... 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° PQUA N° – SENASA

TITULAR E IMPORTADOR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401, Of 610.
Lima 33. Perú.
Teléfono: 713-9960 anexo 116.



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
Binhai Economic Development Area Weifang,
Shandong 262737, China.
Tel. 086 531 88875230// 88875231

Contenido Neto: 4 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIFREE es un fungicida sistémico y de contacto, con actividad preventiva, curativa, y de amplio espectro en pimientos, cereales, enfermedades como el oidio, roya, sarna. Actúa por la interferencia con la biosíntesis de ergosterol en los hongos, por la inhibición, la desmetilación de esteroides, que conduce a los cambios morfológicos y funcionales de la membrana celular de los hongos.

- Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- La absorción de DIFREE puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15	0.30	12	5.0

P.C. = Período de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar DIFREE (i.a. difenoconazole) una vez por campaña como máximo, considerando dos campañas por año. Aplicar cuando las condiciones sean favorables o se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

DIFREE es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de sustancias fuertemente oxidantes. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

DIFREE no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

