

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico
- En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón. Si la irritación ocurre y persiste consulte al médico.
- En caso de inhalación: remueva al paciente al aire fresco. Si la respiración cesa, darle respiración artificial y traslade al paciente de inmediato a un centro de salud.
- En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vomito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.

**ANTÍDOTO:** Sulfato de Atropina

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

ESSALUD: 0801-1-0200  
 CICOTOX: 0800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ENFURAN

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Carbosulfan ..... 200 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1 L

**PQUA N° XXX - SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
 Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

**IPROCHEM COMPANY LIMITED**  
 35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd., Luohu District, Shenzhen, CHINA

**Contenido Neto: 200L**

**N° Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** ENFURAN es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y vía sistémica. Se emplea para el control de plagas foliares y del suelo como: insectos masticadores, chupadores y minadores en diversos cultivos.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de ENFURAN recomendada, agitando bien y completar luego con más agua.

**“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	L/ha	mL/200 L		
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.8	800	20	2

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar una aplicación por campaña/año y aplicar a la emergencia de las plantas de papa.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** ENFURAN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** ENFURAN no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis señaladas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

