

Etiqueta BULLDER x 500 mL COEX 22.8 x 12 cm

18/5/2018

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

.Este producto es tóxico si se ingiere
.Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión
.No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
.Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
.Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
.Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
.No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
.Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

.Grupo químico: Carbamatos.
.En caso de contacto con los ojos: lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico
.En caso de contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón. Si la irritación ocurre y persiste consulte al médico.
.En caso de inhalación: remueva al paciente al aire fresco. Si la respiración cesa, darle respiración artificial y traslade al paciente de inmediato a un centro de salud.
.En caso de ingestión: suministre 2 vasos de agua e induzca al vomito introduciendo en la cavidad bucal un dedo. Nunca inducir al vómito a un paciente inconsciente.

ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

ESSALUD: 0801-1-0200
CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

.Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
.Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
.Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos de 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Bullder

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Carbosulfan 200 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

PQUA N° 1915 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd., Luohu

District, Shenzhen, CHINA

Contenido Neto: 500mL

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: BULLDER es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y vía sistémica. Se emplea para el control de plagas foliares y del suelo como: insectos masticadores, chupadores y minadores en diversos cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de BULLDER recomendada, agitando bien y completar luego con más agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		L/ha	DOSIS mL/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico				
Papa	Gorgio de los Andes	Premotrypes suturalis	0.8	800	20	2

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña/año y aplicar a la emergencia de las plantas de papa.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: BULLDER es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: BULLDER no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

