

Etiqueta ENFURAN para 1 L, COEX 28.7 x 15 cm

07/02/17

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es tóxico si se ingiere.
Evitar el contacto con la piel, evitar el vapor o nebulización.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Útilice todo el producto durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las condiciones de seguridad.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbamatos
En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un médico.
En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada y lave con agua y jabón. Si la irritación ocurre y persista consulte al médico.
En caso de inhalación, remueva al paciente al aire fresco. Si la respiración cesa, darle respiración artificial y llévelo al paciente de inmediato a un centro de salud.
En caso de ingestión, lavar la boca con agua o leche y no inducir al vómito incómodando en la cavidad bucal un dedo. Nunca reducir al vómito a un paciente inconsciente.

ANTIDOTO: Sulfato de Atropina**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

ESSALUD: 0801-1-0200
CICOTOX: 0604-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el producto, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego incinerado incinerando o perforándolo y depositarlo en los lugares designados por las autoridades locales para esto fin.
No utilizar conjuntamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligro para abejas y arácnidos benéficos. No aplicar en época de floración.
Peligro para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No utilizar los restos de la aplicación o sobranza del producto.
Respetar una banda de no aplicación basada en las recomendaciones.
Peligro para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para esto fin.



ENFURAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA**Suspensión Concentrada (SC)**

COMPOSICIÓN: 200 g/L
Carbosulfan c.s.p 1 L
Aditivos

PQUA N° XXX - SENASA

Título del Registro, Importador y Distribuidor

FARMAGRO S.A.
Avenida Comercio 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO

FARMAGRO S.A.

Formulador

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nantou Rd., Luohu
District, Shenzhen, CHINA

Contenido Neto: 1L**N° Lote:****Fecha de Formulación:****Fecha de Vencimiento:****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ENFURAN es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y vía sistémica. Se emplea para el control de plagas foliares y del suelo como: insectos, maderadores, chupadores y minadores en diversos cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Unir con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregar la cantidad de ENFURAN recomendada, agitando bien y completar luego con más agua.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	EQUIVALENCIA DE LA PLAGA			Dosis ml/100 L	Litros por hectárea
	Carbón	Técnica	Uso		
Papa	Control de los Aroses	Phenanthropes subarabae	0.8	800	20

P.C. Periodo de latencia en días.

L.M.H. Lente máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña/afío y aplicar a la emergencia de las plantas de papa.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ENFURAN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: ENFURAN no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas. Si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."