

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Pendipax 500 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Pendimethalin..... 500 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° 1920 – SENASA

Nombre CAS: N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine

Nombre IUPAC: N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

Fórmula química: C₉H₁₆N₂O₄P

Peso molecular: 281.3 g/mol


Punto de fusión: 54°C-58°C

Densidad: 1.19 g/ml, 25°C

Solubilidad en agua: 0.33 mg/L, 20°C, pH 7

LogPow: 5.4, pH 7

Presión de vapor: 3.34 mPa, 20°C



TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. El Polo N°401 Oficina 610 ,Santiago de Surco, Lima. Perú. Teléfono: (511) 713-9960

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902

Urb. A. Von Humboldt , Miraflores - Lima - Perú.

Teléfono: +51960241693

Rainbow
all about growing

Solandina

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para

ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la

aplicación

- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y

bañese con abundante agua y jabón.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para

conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Dinitroanilinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve

al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.

- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada si la

persona esta inconsciente

- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y

enjuagar con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes

de contacto si los hubiera

• En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.

Bañarse con abundante agua y jabon

En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y

trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración artificial si fuera

necesario.

- Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico, el

tratamiento sintomático y de soporte

TÉLFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Teléfono del titular RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 713-9960



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta

la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo

o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino

dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos* No contaminar lagos, ríos,

estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación

o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de

al menos 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas

superficiales o suelos altamente permeables.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios

destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Pendipax 500 EC es un herbicida del grupo de las Dinitroanilinas,

selectivo al cultivo de maíz que ofrece un control eficaz de una

amplia gama de malezas ejerciendo su actividad mediante la

inhibición del desarrollo de la mismas, las cuales mueren poco

después de haber germinado o luego de haber emergido del suelo,

no deja residuos que puedan dañar los cultivos subsiguientes. Este

herbicida inhibe tanto la división como la elongación celular en

meristemas de tallo y la raíz de las malezas susceptibles.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad

Pendipax 500 EC a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad

y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido

mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o

manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y

asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	1.5-2.0*	30	0.05
	Coquiño	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium halepense</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Yuyo o bleado	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Pichana o rajamano	<i>Sida paniculata</i>			

*Realizar una aplicación en post-emergencia de entre 15-20 cm de altura

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **Pendipax 500 EC** a una aplicación por

campana, como máximo considerando una campaña al año. Usar

la menor dosis cuando se presente baja infestación y la dosis alta

cuando se presenten mayores valores de infestación.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Pendipax 500 EC es compatible con la mayoría de los productos

de reacción neutra. En caso de duda, se recomienda realizar una

prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Pendipax 500 EC no es fitotóxico a los cultivos aquí

recomendados. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas

en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las

características físico químicas del producto contenido en este

envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz

para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a

las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor

información comuníquese con el titular de registro o con el

distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO