

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada si la persona está inconsciente
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

Teléfono del titular RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 713-9960

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Pendipax<sup>500 EC</sup>

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**HERBICIDA AGRICOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Pendimethalin..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

PQUA N° 1920 – SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. El Polo N°401 Oficina 610 ,

Santiago de Surco, Lima. Perú

Teléfono: (511) 713-9960



**FORMULADOR:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

https://www.rainbowagro.com/

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**DEMETRA GROUP S.A.C**

Cal. Gamma Mza. B-7 Lote 19

Urb. Bocanegra, Callao. Lima-Perú

Teléfono: 993829139

www.demetra.com.pe

**Contenido Neto: 100 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Pendipax 500 EC** es un herbicida del grupo de las Dinitroanilinas, selectivo al cultivo de maíz que ofrece un control eficaz de una amplia gama de malezas ejerciendo su actividad mediante la inhibición del desarrollo de la mismas, las cuales mueren poco después de haber germinado o luego de haber emergido del suelo, no deja residuos que puedan dañar los cultivos subsiguientes. Este herbicida inhibe tanto la división como la elongación celular en meristemas de tallo y la raíz de las malezas susceptibles.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad **Pendipax 500 EC** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Malezas             |                               | Dosis    | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|---------------------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
|         | Nombre común        | Nombre científico             | L/Ha     |              |              |
| Maíz    | Amor seco           | <i>Bidens pilosa</i>          | 1.5-2.0* | 30           | 0.05         |
|         | Coquito             | <i>Cyperus rotundus</i>       |          |              |              |
|         | Gramma china        | <i>Sorghum halepense</i>      |          |              |              |
|         | Hierba de gallinazo | <i>Chenopodium halepense</i>  |          |              |              |
|         | Pata de gallina     | <i>Eleusine indica</i>        |          |              |              |
|         | Yuyo o bledo        | <i>Amaranthus dubius</i>      |          |              |              |
|         | Lechera             | <i>Euphorbia heterophylla</i> |          |              |              |
|         | Pega pega           | <i>Setaria verticillata</i>   |          |              |              |
|         | Cadillo             | <i>Cenchrus echinatus</i>     |          |              |              |
|         | Pichana o rajamano  | <i>Sida paniculata</i>        |          |              |              |

\*Realizar una aplicación en post-emergencia de entre 15-20 cm de altura

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **Pendipax 500 EC** a una aplicación por campaña, como máximo considerando una campaña al año. Usar la menor dosis cuando se presente baja infestación y la dosis alta cuando se presenten mayores valores de infestación.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**Pendipax 500 EC** es compatible con la mayoría de los productos de reacción neutra. En caso de duda, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

