

27.5 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

14.0 ± 0.3 cm

2.1 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Estrobilinas + Triazole
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106 NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Azoxystrobin.....250 g/L  
Difenoconazole.....250 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1926 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED  
29 Xiaohang Road, Nanjing, China.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

CONFIEE PLUS 500 SC es un fungicida sistémico, de contacto y translaminar. En el mecanismo de acción inhibe la respiración mitocondrial y la biosíntesis de ergosterol del hongo.

**Modo de empleo:**

CONFIEE PLUS 500 SC se emplea previamente diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución al tanque de aplicación completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivos vecinos.

CONFIEE PLUS 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, etc. Los equipos deben estar en buen estado para su funcionamiento y boquillas correctamente calibradas, usando el equipo de protección personal.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Arándano	Cabeza Clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.10 - 0.15	27	(a) 5 (b) 4
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.3	30	(a) 5 (b) 8
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.2	7	(a)10 (b)0.5
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.15 - 0.2	31	(a)0.01 (b)0.05
Melocotonero	Podredumbre morena	<i>Monilinia fructicola</i>	-	0.15-0.2*	15	(a) 2 (b) 2.5
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0,4-0,5	-	14	(a) 2 (b) 3

P.C.: Período de carencia  
\*Gasto de Agua: 400-850 L/ha; pH: 6.0-6.5

L.M.R.: Límite máximo de residuos  
(a)Azoxystrobin (b)Difenoconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

CONFIEE PLUS® 500 SC se aplica de manera preventiva y cuando las condiciones medio ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Para el cultivo de arándano, arroz, cebolla, espárrago, melocotonero y vid se recomienda realizar 1 aplicación por campaña/plaga como máximo, considerando una campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se podrá ingresar a la zona tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD:**

CONFIEE PLUS® 500 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos, bases fuertes, agentes oxidantes, agentes reductores y aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

