KAMUY® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Fenpyrazamine ..... 500 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
SMTM PERÚ S.A.C.
Av. República de Panamá 3531 Int. 1203
San Isidro, Lima - Perú

Formulado por:

SUMITOMO CHEMICAL
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku
Tokio 104-8260, Japón

CONTENIDO NETO: 1 Kilo

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ARCHIVO FINAL	Ref. Bolsa 1 Kilo - Cara anterior	TINTAS (3)
Producto: Kamuy 50 WG - Sumitomo	**País:** Perú	Pantone 293 C, Pantone 485 C, Negro
Fecha: Abril 18 de 2017	**Tamaño:** 260mm x 390mm	

univisual2@gmail.com - univisual@cable.net.co

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir.
Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas, después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: **Pyrazolium.**
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral, si la persona esta inconsciente o convulsione.
En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencias: ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0800-1-3040 SMTM PERÚ S.A.C: 01-421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacía aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KAMUY® 50 WG es un fungicida que actúa inhibiendo la elongación del tubo germinativo y el micelio del hongo.

Poner la dosis recomendada en balde con agua, luego verter la mezcla en el equipo de aplicación y completar con agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En vid realizar (02) aplicaciones por campaña. Considerar 01 campaña al año.

Primera aplicación: Floración.
Segunda aplicación: Cierre de Racimo.

Aplicar en forma preventiva, dosis de 0.8 Kg/ha a inicio de floración. Y la dosis de 1.0 Kg/ha al cierre de racimos cuando se tiene una presión alta de la enfermedad y/o las condiciones climáticas (temperatura y humedad) favorezcan el desarrollo de la enfermedad en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis (Kg/Ha)	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid	Pudrición gris	*Botrytis cinérea*	0.8 - 1.0	7	2

P.C.: Periodo de carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

PE-18/04/2017



ARCHIVO FINAL	Ref. Bolsa 1 Kilo - Cara posterior	TINTAS (2)
Producto: Kamuy 50 WG - Sumitomo	**País:** Perú	Pantone 293 C / Negro
Fecha: Abril 18 de 2017	**Tamaño:** 260mm x 390mm	

univisual2@gmail.com - univisual@cable.net.co