

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
 - Causa irritación a la piel.
 - Causa daño temporal a los ojos.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
 - Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente o padece de convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
 - En caso de contacto con la piel, quite la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua.
 - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX 0-800 - 1- 3040
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
AGROLAC ANDINA EIRL: 4256487 / 2615527

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS:**
- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Altamente peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Contenido Neto: **200 Litros**

Nº Lote:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

TEBUGROL

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Tebuconazole 200 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Registro PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro, importado y distribuido : AGROLAC ANDINA EIRL
Jiron Saenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar
Lima 17
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por: AGROLAC S.A.
Dirección: Av. Dels Vents 9 – 23. Esc. A 60 2ª
08917 BADALONA - BARCELONA - ESPAÑA
Telf: 93 201 12 22 Fax: 93 209 58 97

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TEBUGROL, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa y erradicante. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

TEBUGROL, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de enfermedades como: manchas foliares, pudriciones, royas, etc.

TEBUGROL, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

TEBUGROL, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	E N F E R M E D A D		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
VID	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.14	14	0.5

LMR: Límite Máximo Residuos

PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

Repetir la aplicación en caso de reinfección.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No se ha reportado algún tipo de incompatibilidad con pesticidas. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

