SIN MEDIDAS
MAYO 2017
ML

TIRA

PANTONE 293 C

Stampida

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

Composición:

2,4-D dimethylamina . . . . . 970 g/kg
Aditivos . . . . . csp 1 kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro: **MONTANA S.A.**
Av. Javier Prado Este N° 6210. Oficina 401, La Molina. Lima-Perú
Teléfono: 511-4193000 / Email: info@corpmontana.com

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington
Street Central HK. China.

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210,
Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 10 kg
Lote Nº:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

MONTANA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SIN MEDIDAS
MAYO 2017
ML

RETIRA

PANTONE 293 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
¨MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Este producto es un posible CARCINOGÉNICO para los seres humanos.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Fenoxiacético.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área tratada y trasladarla a un ambiente ventilado. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico:
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
MONTANA S.A: 01-4193000.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
- Después de usar el contenido, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
STAMPIDA es un herbicida selectivo en el cultivo de caña de azúcar y actúa de manera post emergente sobre las malezas de hoja ancha. Es absorbido por hojas y raíces moviéndose tanto por xilema como floema.

STAMPIDA actúa como un regulador de crecimiento ya que altera el balance hormonal normal de las plantas que regula procesos como la división y elongación celular, respiración, la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas. Las malezas afectadas presentan retorcimiento de peciolos y tallos, formación de callosidades, malformación de hojas y finalmente la necrosis y muerte de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
- Aplicar sobre malezas en activo crecimiento, que posean al menos de 2 a 6 hojas verdaderas con buena área foliar para asegurar penetración, pero en lo posible de no más de 40 centímetros de altura.
- Es recomendable que el suelo se encuentre con una adecuada humedad (capacidad de campo) al momento de la aplicación.
- De ser necesario se recomienda repetir una segunda aplicación dirigida en zonas que aún presenten malezas de hoja ancha. No realizar más de dos aplicaciones por año.
- No aplicar en presencia de vientos fuertes para evitar pérdidas por deriva que pueda afectar a cultivos de hoja ancha.
- No aplicar en malezas viejas, o sometidas a estrés severo por falta de agua, temperatura, ya que pueden responder menos eficientemente; estas condiciones no garantizan la penetración ni el transporte del ingrediente activo hasta el sitio de control.

METODO DE APLICACIÓN:
Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, realizar una pre mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado como pulverizadores manuales de palanca (mochila) o equipos accionados por el tractor. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con otros herbicidas de uso común, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
STAMPIDA es fitotóxico a cualquier planta de hoja ancha, por lo tanto, debe evitarse el contacto directo con plantas cultivadas de hoja ancha.

STAMPIDA no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS Kg/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Caña de azúcar	Amor Seco	*Bidens pilosa*	0.50-0.70	20	0.05
	Capulí cimarrón	*Nicandra physalodes*			
	Chamico	*Datura stramonium*			
	Hierba Mora	*Solanum nigrum*			
	Higuerilla	*Ricinus communis*			
	Lechera	*Euphorbia spp.*			
	Yuyo	*Amaranthus viridis*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos