

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar al  
0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**BASF Peruana S.A.**

Av. O.R. Benavides 5915 Callao 1  
Casilla 3911, Lima 100. Telf.: (01) 513 2500  
Fax: (01) 513 2518 - (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR:

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**

Apartado Aéreo 53895  
Bogotá-Colombia



Dow AgroSciences

**Goal™**



**2 EC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Oxyfluorfen .....240 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro N° 076-96-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

CONTENIDO NETO: 250 mL.

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Rev. 25/04/2017

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** Goal™ 2 EC, es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emerger) y propiedades residuales en el suelo (antes de emerger); controla en forma efectiva malezas de hoja ancha y gramíneas provenientes de semilla. Aplicar con equipos convencionales de aspersión terrestre (de palanca y de motor).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** En cebolla, las aplicaciones se realizan en post-emergencia al cultivo en un volumen de 500 - 600 L/ ha. No debe usarse ningún surfactante en aplicaciones post-emergentes totales. • En arroz de transplante, las aplicaciones se efectúan 2 - 4 días antes del transplante en un volumen de 200L - 300L de agua/ha. **NO APLICAR Goal™ 2 EC UNA VEZ QUE EL ARROZ HA SIDO TRANSPLANTADO.** • En caña de azúcar, las aplicaciones se realizan en pre-emergencia al cultivo, 2 - 3 días después del riego de germinación en un volumen de 200L - 300L /ha. • En algodón, las aplicaciones se realizan en pre-emergencia al cultivo. • En cítricos, aplicar antes de la floración, dirigido al suelo.

Alcachofa: 1 aplicación por campaña, 5 días antes del transplante. Vid, mandarina, manzano, melocotón, naranjo, plátano: 2 aplicaciones al año cada 2 meses. Caña de azúcar: aplicar a los 25 días después del transplante.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD:** Goal™ 2 EC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** Aplicado a las dosis y formas de aplicación recomendadas no hay efectos en los cultivos sucesivos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

