

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar al
0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O.R. Benavides 5915 Callao 1
Casilla 3911, Lima 100. Telf.: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2518 - (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Apartado Aéreo 53895
Bogotá-Colombia



Dow AgroSciences

Goal™ 2 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Oxyfluorfen240 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro N° 076-96-AG-SENASA

Titular del registro: **DuPont Perú S.A.C.**

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27. Lima-Perú

CONTENIDO NETO: 250 mL.

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

1812

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Goal™ 2 EC, es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emerger) y propiedades residuales en el suelo (antes de emerger); controla en forma efectiva malezas de hoja ancha y gramíneas provenientes de semilla. Aplicar con equipos convencionales de aspersión terrestre (de palanca y de motor).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En cebolla, las aplicaciones se realizan en post-emergencia al cultivo en un volumen de 500 - 600 L/ ha. No debe usarse ningún surfactante en aplicaciones post-emergentes totales. • En arroz de transplante, las aplicaciones se efectúan 2 - 4 días antes del transplante en un volumen de 200L - 300L de agua/ha. **NO APLICAR Goal™ 2 EC UNA VEZ QUE EL ARROZ HA SIDO TRANSPLANTADO.** • En caña de azúcar, las aplicaciones se realizan en pre-emergencia al cultivo, 2 - 3 días después del riego de germinación en un volumen de 200L - 300L /ha. • En algodón, las aplicaciones se realizan en pre-emergencia al cultivo. • En cítricos, aplicar antes de la floración, dirigido al suelo.

Alcachofa: 1 aplicación por campaña, 5 días antes del transplante. Vid, mandarina, manzano, melocotón, naranjo, plátano: 2 aplicaciones al año cada 2 meses. Caña de azúcar: aplicar a los 25 días después del transplante.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Goal™ 2 EC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Aplicado a las dosis y formas de aplicación recomendadas no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

