

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106. SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERÚ: (511) 444-3096. CICOTOX: 0800-13040.



Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SummitAgro

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERÚ
Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro Lima, Perú. Telf.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

 Dow AgroSciences

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 N° 7-21. Torre A, oficina 1401. Bogotá-Colombia

Goal™ 2 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Oxyfluorfen 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro N° 076-96-AG-SENASA

CONTENIDO NETO: 250 mL

N° DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

©™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Goal™ 2 EC, es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emerger) y propiedades residuales en el suelo (antes de emerger); controla en forma efectiva malezas de hoja ancha y gramíneas provenientes de semilla. Aplicar con equipos convencionales de aspersión terrestre (de palanca y de motor).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Alcahofa: 1 aplicación por campaña, 5 días antes del trasplante. Vid, Mandarina, Manzano, Melocotón, Naranja, Plátano: 2 aplicaciones al año cada 2 meses. Caña de azúcar: Aplicar a los 25 días después del brotamiento. Algodón, Arroz, Cacao, Café, Cebolla, Chirimoya: 1 aplicación al año. En general para todos los cultivos las recomendaciones son considerando 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: Goal™ 2 EC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Aplicado a las dosis y formas de aplicación recomendadas no hay efectos en los cultivos sucesivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

