Pantone 2747 Pantone Yellow Cyan
Pantone 347 Pantone Black

37.5 x 20 cms

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Anthranilic diamide + Pyrethroid.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
- CICOTOX: 0800-13040
- CISPROQUIM: 0800-50-847
- ESSALUD: 4118000 anexo 4

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración, ni cuando se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano por las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AMPLIGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición
Chlorantraniliprole ..... 100 g/L
Lambda-cyhalothrin ..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. ..... 1 Litro

Reg. PQUA N°: 1333-SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguin 335, Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima

Importado y Distribuido por:
TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima– Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:
Syngenta Production France S.A.S
Francia

Lote Nº.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™, El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Contenido neto:
200 Litros

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **AMPLIGO®** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso del insecto y deteniendo inmediatamente la alimentación.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad del producto a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y luego completar con agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **AMPLIGO®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	cc/cil		
Esparrago	Gusano perforador	*Spodoptera frugiperda*	0.30		30	*0.01 / **0.01
	Copitarsia corruda	*Copitarsia corruda*				
Tomate	Polilla del tomate	*Tuta absoluta*	0.25		3	*0.6 / **0.1
	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	0.3 – 0.35			
	Gusano ejército	*Spodoptera eridania*				
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.15		30	*0.02 / **0.02
Brocoli	Palomilla del dorso de diamante	*Plutella xylostella*	0.3		1	*4/**0.4
Pimiento	Polilla del fruto	*Symmestrichema capsicum*	0.25		7	
	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	0.3			
Papa	Gusano perforador	*Premnotrypes suturicallus*		250	30	*0.02/ **0.01

PC: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos **ppm:** partes por millón
*Chlorantraniliprole **Lambda-cyhalothrin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
- Realizar dos aplicaciones por campaña/año para espárrago, maíz, brócoli y pimiento y una aplicación campaña/año para tomate y papa. Aplicar tan pronto observen los primeros daños.
- Para el manejo de la resistencia, rotar con productos de diferentes grupos químicos y de diferentes mecanismos de acción. Aplicar **AMPLIGO®** usando una "ventana de aplicación", luego rotar con bloques de aplicación de productos efectivos de diferente mecanismo de acción antes de realizar aplicaciones adicionales de insecticidas del mismo grupo al que pertenecen Chlorantraniliprole y Lambda-cyhalothryn.

PERIODO DE REINGRESO
- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD
- **AMPLIGO®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD
- Al aplicar el producto de acuerdo a las indicaciones dadas, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AM 11 19

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

3.0 cms