

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:  
**CICOTOX: 0800-13040 (gratuito).**  
**CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS: 0800-10828.**



**Contenido Neto : 500 ml**  
Lote N° :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

v20170502

# MULTIVOLT®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Thiamethoxam.....150 g/L  
Bifenthrin..... 100 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**

Titular del registro: HORTUS S.A.  
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300, Providencia.  
Santiago, Chile  
Teléfono: (56 2) 24706800  
Fax: (56 2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax:718-8684  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MULTIVOLT es un insecticida formulado como suspensión concentrada (SC) que contiene 150 g de thiamethoxam y 100 g bifentrina por litro de producto formulado. La combinación de los componentes el confieren características de sistémico y le proporcionan efecto choque , por lo que afecta a insectos que se alimentan de la sabia y a los que se encuentran sobre plantas tratadas.

MULTIVOLT se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente. La boquilla a usar debe ser cónica vacía, dar buena cobertura.

Antes de preparar, asegúrese que el agitador del tanque esté operativo, el mismo que debe mantenerse en funcionamiento durante todo el periodo de aplicación. Regule el agua a un pH entre 5 - 6. Vierta el agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador; diluya el producto en un balde; luego vierta en el tanque del pulverizador con el agitador en funcionamiento. Complete con agua hasta el nivel deseado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cuadro de usos:

| CULTIVO   | P L A G A    |                   | DOSIS<br>(L/200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                              |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
|           | Nombre Común | Nombre Científico |                   |              |                                           |
| Mandarina | Araña roja   | Panonychus citri  | 0.05 - 0.125      | 30           | 0.5 <sup>(1)</sup><br>0.05 <sup>(2)</sup> |

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.  
(1) Thiamethoxam.  
(2) Bifenthrin.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

