

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar gratis a:  
**CICOTOX: 0800-13040.**  
**CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE  
ESSALUD: 0-801-10200.**



**Contenido Neto : 500 ml**  
Lote N° :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

v20170517

# ITAKI®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**  
Dimethomorph..... 300 g/L  
Azoxytrobin..... 150 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**

**Titular del registro: HORTUS S.A.**  
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

**Formulado por:**



Gleba S.A.  
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,  
Melchor Romero - La Plata  
Buenos - Aires  
Tel (Fax)(0221) 4913062/6093  
www.gleba.com.ar

**Importado y Distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 717-9041  
Fax: 718-8684  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ITAKI** es un fungicida cuyos ingredientes activos en su efecto combinado proporcionan una amplia protección contra las plagas. Azoxytrobin, inhibe la germinación de esporas y crecimiento del micelio, así como también posee actividad antiesporulante. Dimethomorph, es inhibidor de la síntesis de celulosa.

**ITAKI** se aplica como pulverización aérea con equipos convencionales como mochila manual o a motor. Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el tanque del equipo que se va a utilizar hasta la mitad con agua, poner el agitador en marcha y agregar la dosis requerida. Finalmente completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo el agitador en marcha para lograr una solución homogénea, estos deben mantenerse funcionando durante toda la aplicación.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | ENFERMEDAD       |                               | DOSIS<br>(L/cil) | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)                               |
|---------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
|         | Nombre Común     | Nombre Científico             |                  |                |                                            |
| Papa    | "Hielo" (Rancha) | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.5 - 0.625      | 30             | 0.15 <sup>(1)</sup><br>1.00 <sup>(2)</sup> |

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

(1) Dimethomorph (2) Azoxytrobin

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

