

CANTERA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Propineb..... 700 g/kg

Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Gleba S.A.
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero - La Plata
Buenos - Aires
Tel (Fax)(0221) 4913062/6093
www.gleba.com.ar

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: 500 g

Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

v20170511

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbamato.
- **En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- **En caso de ingestión:** no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- **En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- **En caso de contacto con la piel:** retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
CICOTOX: 0800-13040.
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CANTERA es un fungicida de amplio rango de acción, cuyo ingrediente activo es propineb al 70%, formulado como polvo mojable para ser aplicado en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Actúa en diferentes sitios del hongo, tiene una acción de contacto, preventiva.

Acondicione el volumen de agua necesaria a un pH de 5.5 a 6.0. Realice una pre mezcla en agua acondicionada. Vierta la pre mezcla en el tanque del equipo pulverizador. Agregue un adherente. Cuide que el agitador del equipo pulverizador se encuentre funcionando, desde cuando vierte la mezcla hasta culminar la aplicación. Lave el equipo de aplicación sin contaminar las fuentes de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma preventiva al ataque de las enfermedades, repitiendo el tratamiento de acuerdo con las condiciones medioambientales.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: CANTERA, puede ser usado solo, en mezclas o con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.50	7	0.2

PC: Periodo de Carenia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

