

DINAMIC[®] 70 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

Composición:

Amicarbazone.....700 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1 Kg

PQUA N° 1938 - SENASA

Titular del registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú
Telf: 2215729



Formulado por:
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
Salto de Pirapora/SP - Pilar do Sul,
km 122 -CEP 18160-000 - Brasil

Importado y Distribuido por:
Silvestre International Company S.A.C.
Calle Virrey Manuel Amat y Juniet 502
Dpto. 101 - Urb. La Virreyña
Santiago de Surco - Lima - Perú
Telf: 01-3634668

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:
Contenido Neto: **1 Kg**



©Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es **DANINO**, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazolone
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área afectada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Báñese inmediatamente con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Remover los lentes de contacto si los hubiera. Llamar al médico o llevar al Centro Médico de salud.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

Nota al médico:

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040, 3287700
ESSALUD: 4118000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: 2215729

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, inutilice el envase, triturándolo o depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINAMIC® 70 WG, es un herbicida sistémico suelo activo con actividad foliar y radicular aplicado en la Pre-siembra incorporada (PSI) o la Pre-emergencia (PRE) del cultivo y de la maleza, para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas anuales y perennes propagadas por semilla. Es un inhibidor de la fotosíntesis.

La aplicación en Pre-siembra (PSI) debe ser incorporada superficialmente (3-5 cm) con una labor de rastraje o cultivador. Si la aplicación es realizada en Pre-emergencia (PRE), ésta se debe realizar en forma oportuna inmediatamente después de la siembra, una vez la semilla haya sido tapada.

La aplicación de Pre-emergencia (PRE) debe ser incorporado mediante riego por aspersión, pivote, o cuando se prevén lluvias permitiendo que el producto se mueva a la zona de germinación. Utilizar la mayor dosis cuando exista alta presión de malezas en el predio. En suelos con materia orgánica menor al 5% utilizar las dosis menores. En suelos con materia orgánica mayor al 5% utilizar las dosis mayores. Utilizar un mojado de 200-400 L agua/ha.

DINAMIC® 70 WG se aplica con equipos de aspersión terrestre, en mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por temporada de Pre-emergencia (PRE) o Pre-siembra (PSI).

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DINAMIC® 70 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD

DINAMIC® 70 WG no es fitotóxico si es aplicado a los cultivos recomendados y si se sigue las instrucciones indicadas en la etiqueta. Evitar aplicar si existen condiciones de estrés, anegamientos, siembras irregulares o semillas destapadas. Evite sobredosificar y los traslapes.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

| CULTIVO | Maleza | | Dosis (Kg/Ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Maíz | Gramma china (Gramalote) | <i>Sorghum halepense</i> | 0.5-0.8 | N.D. (No corresponde por la época y forma de uso) | 0.05 |
| | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i> | | | |
| | Cadillo | <i>Cenchrus quinatus</i> | | | |
| | Verdolaga | <i>Portulaca oleracea</i> | | | |
| | Amor seco | <i>Bidens pilosa</i> | | | |
| Caña de azúcar | Gramma china (Gramalote) | <i>Sorghum halepense</i> | 1.25-1.75 | N.D. (No corresponde por la época y forma de uso) | 0.15 |
| | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i> | | | |
| | Correhuela | <i>Ipomoea quinquefolia</i> | | | |
| | Verdolaga | <i>Portulaca oleracea</i> | | | |
| | Amor seco | <i>Bidens pilosa</i> | | | |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

