21.08.2017

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASESVACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase, y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BUPROMAX®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Buprofezin…….…….…..... 250 g/kg
Aditivos…….…….... csp 1 kg

PQUA N° 1932-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:
SerfiSA®
Av. República de Panamá N° 2577
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 710-4000

Distribuido por:
neoagrum
Pje. Camino de Acceso N°2 Urb.
Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho-Lima
Teléfono: 617- 6400

N° de Lote :
Fecha de Fabricación :
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TOXICO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar fresco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Thiadiazine**
- **En caso de intoxicación o ingestión, lleve el paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.**
- **En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente.**
  No provoque el vómito.
- **En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.**
- **Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.**
- **Teléfonos de emergencia:**
  CETOX: 0800 71911
  ESSSALUD: 411 – 8000 (opción 4)

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BUPROMAX** es un insecticida que actúa por contacto, inhibiendo la síntesis de la quitina del insecto al momento de la muda. Su efecto es en el estado larval de desarrollo del insecto.
- **BUPROMAX** se usa en pulverización muy fina sobre el follaje. Para preparar la solución de la aplicación se deberá colocar un poco de agua en un envase, agregar la cantidad de producto que se va a usar y agitar. Después de agrega el total de agua que se va a aplicar; es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plagas		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Cil 200L		
Naranjo	Mosca blanca	*Aleurothrixus floccosus*	0.2	14	1
Olivo	Queresa blanca	*Praelongorthezia olivicola*	0.2	21	0,3

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.: Límite Máximo**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.
- Máximo aplicar 1 kg/ha
- Rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción con el fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis y cultivos registrados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.