30.0 cm

15.0 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- El producto causa irritación a los ojos.
- Evite el contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Benzoyl ureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada, con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconciente.
- Nota al Médico, no tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

TELEFONOS DE EMEGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200
GOLDER SAC : 998128710

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

CINIASE® 50EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Lufenuron ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA PQUA N° 1893 - SENASA

Titular del Registro:
GOLDER SAC
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulador:
Kinyeld Industry Co. Limited

Importado por:

GOLDER

Contenido Neto: 1 L
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Aplicar **CINIASE 50 EC** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200 L	L/Ha		
Espárrago	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.15 - 0.2	0.375 - 0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2	0.5	10	0.02
Tomate	Caballada (Gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.15 - 0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.6 - 0.7	7	1

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga, previa evaluación del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a la dosis y usos recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.