

17,0 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SPOILER® 80% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Fosetyl aluminium.....800 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosfato
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia:
 ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200 (línea gratuita),
 CICOX 0800-13040 (línea gratuita),
 INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS 2267332

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

TITULAR DE REGISTRO:

IPEH

FORMULADOR:

Jiangsu High Hope Corporation
15, Hubu Street Nanjing, Jiangsu CHINA
Tel: 86-25-86895000

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :

IPEH
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro
Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951- 2267332
www.ipeh.org.pe

Registro PQUAN° ... - SENASA



Fecha de Formulación : x
Número de Lote : x
Contenido Neto : 5 Kilos
Fecha de vencimiento : x

® = Marca Registrada por IPEH

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SPOILER 80% WP** es un fungicida sistémico ascendente y descendente. Posee una rápida penetración y una larga persistencia en el interior de la planta. Estimula los mecanismos de defensa natural de la planta en la producción de fitoalexinas, frente a posibles ataques de enfermedades.
- Preparación de la mezcla:
Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/200L	P.C. (Días)	LMR (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico			
PIMIENTO	Azul o Hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0,7	15	130

P.C.: Periodo de carencia / L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña por año, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. El intervalo de aplicación es de 30 días.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Incompatible con compuestos alcalinos, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. En caso de dudas sobre la compatibilidad efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



25,0 cm