

37.0 cm

SUSKU®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 1936 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 3 Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD
Room 10D, Haihua Plaza Nº 658, Jian Guo Road

DROKASA
P E R U

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 4 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la sección de Viento. No trabajar en la redina del líquido asperjado.
- No reentrar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ingestión: Enjuague la boca con agua. Llévela al médico inmediatamente, o llévela al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, no induzca al vómito. Si la persona está inconsciente o padece convulsiones no dar nada por vía oral.
- En caso de irritación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: CETOX. Tel.: 0800-71811 ó 999-072933; ESSALUD Tel.: 423-7800 ó 0801-10200; DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar ni dañar a las aves, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos, aves silvestres, ni a la flora silvestre. No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO
SUSKU es un fungicida sistémico y transaminar de amplio espectro, puede ser usado para controlar a los patógenos que ocasionan diversas enfermedades en sus campos de cultivo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
SUSKU se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual o amador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS		PC días	LMR ppm
			ml/200 L	L/ha		
Vid	Oidio	Erysiphe necator	-	0.5 - 0.6	14	2
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	-	0.50 - 0.55	7	7.0*

LMR: Límite máximo de residuos

*Azoxystrobin; **Difenoconazole

PC: Período de carencia

PREVENCIÓN Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar dos aplicaciones/campaña/año como máximo y se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica, respetando el período de carencia.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

SUSKU es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



00

32

12.0 cm