

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de USO DOMICILIAR, no profesional.
- Peligroso, si se inhala. Evite respirar la nebulización.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piridinas**
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- ESSALUD: 0800-10-326 (Línea gratuita).
- CICOTOX: 0-800-1-3040.
- AGRILAB PERUS R.L. 261-5227, C/ISPROQUIM. 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturándolo y/o perforándolo.
- deposite en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Proteger una banda de no aplicación (zona de seguridad) de al menos 5 metros.
- Evitar la aplicación en áreas protegidas o sensibles en áreas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

MULIGAN 10 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Pyrproxyfen 100 g/L
Aditivos csp..... 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Contenido Neto: 500 mL

Formulado por: **PROPLAN (Plant Protection Company, S.L.)**

Dirección: C/Valle del Roncal, 12, 1ª 28232, Las Rozas, Madrid España.
Telf: 34-91-626 60 97, Fax: 34-91 626 60 99

Títular e importador:

AGRILAB PERÚ S.R.L.
Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf: +(511) 425-6487, 281-5227

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MULIGAN 10 EC es un insecticida regulador de crecimiento con acción de contacto, por ingestión, y posee acción trans laminar, en las hojas, tiene una estructura parecida a la hormona juvenil de los insectos. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Control de Plaga		Dosis L/200	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
MANDARINA	"Querena coma"	<i>Lepidosaphes becki</i>	0.1	30	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se puede realizar máximo 1 sola aplicación por campaña.
Aplicar cuando la plaga estén en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

