

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DE
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 36 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar gratis a:
CICOTOX: 0800-13040.
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200, Opción 4; 117.



Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

CHOQUE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Spirodiclofen 240 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Formulado por: **anasac**
Almirante Pastene 300,
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706900
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por: **hortus**
Calle Sucre 270 Alta, Lima, Perú.
Tel.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CHOQUE es un acaricida de contacto a base de Spirodiclofen que interfiere en la biosíntesis de lípidos al bloquear la acetil coenzima A carboxilasa de acetil-coenzima, que regula la formación de ácidos grasos. Combate huevos, estadios inmaduros y adultos. Por sus características, se adhiere rápidamente a la capa cerosa de la superficie foliar confiriéndole residualidad.

CHOQUE se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente. Use boquilla de cono vacío para dar buena cobertura y garantizar que el producto llegue a las hojas, frutos y tallos.

Antes de preparar, asegúrese que el agitador del tanque esté operativo, el mismo que debe mantenerse en funcionamiento durante todo el período de aplicación. Regule el agua a un pH entre 5 - 5.5. Vierta el agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador; diluya el producto en un balde; luego vierta en el tanque del pulveriz.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/2000L)	(L/Ha)		
Mandarina	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citi</i>	-	0.6	7	0.04
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.05 - 0.1	-	14	2.0

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuo en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

