

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Amidas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- El producto es nocivo por ingestión contacto con la piel y por inhalación.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX : 0800-1-3040
CISPROQUIM : 0800-50847

Nota al médico:

Se recomienda usar absorbentes como carbón activado.
 Puede generar cianuro de hidrogeno, en caso de observar sintomatología, administrar nitrato de amilo u otro antídoto específico disponible.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado: enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Devuelva este envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración del cultivo objetivo o cultivos colindantes.
- No aplicar a menos de 5m de fuentes de agua.

Recargador[®] 50 SL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRICOLA**

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICION:

Cianamida Hidrogenada..... 500 g/l
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. RCP N° 002 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C.
 Calle Jorge Vanderghen N° 315
 Miraflores. Lima- Perú



FORMULADO POR:
FLAGCHEM Jiansu flag Chemical Industry Co., Ltd.
 Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park
 Luhe, Nanjing, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
PERÚ PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.
 Av. Nicolás Arriola 2374 - San Luis
 Lima, Perú Teléfono: 547-0638

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Lote No.:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RECARGADOR 50 SL es un regulador de crecimiento de plantas destinado para ser usado en el cultivo de vid; el cual necesita horas de frío para tener una adecuada producción. Ante la falta de un invierno muy frío en nuestro país, **RECARGADOR 50 SL**, actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, estimulando así una brotación de yemas homogénea y abundante.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas, y directamente sobre los cargadores para el caso de vid. Utilizar equipo de aspersión manual.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

Cultivo	DOSIS	
	lt/ha	lt/200 Lt
VID	10.0	5.0

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:- En vid, aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yemas productivas. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.

PERIODOS DE REINGRESO:- 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD.- No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas, siendo compatible con surfactantes no iónicos.

FITOTOXICIDAD- No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



● Banda - Yellow C
 ● Marca - Pantone 639 C
 ● Pantone 7481 C