

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoide (imidacloprid) + Carbamato (thiodicarb).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de Ingestión: Llamar al medico inmediatamente. Mantener al paciente en reposo. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuáguelos con abundante agua limpia por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua.
- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario.
- Antídoto: Tratar al paciente sintomáticamente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX 0 800 13040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Uso exclusivo para tratamiento de semillas y en campo abierto.
- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes.
- Respetar una bande de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de escurrimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. •Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. •Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Walker

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS (FS)

Composición:

Imidacloprid 150 g/L
Thiodicarb 450 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQA XXX - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS
FARMAGRO S.A
Av. Alfredo Mendiola 6068.Los Olivos – Lima
Central: (051-1) 614-1500

Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.
29F, Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road, Nanjing, China.

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:
Contenido Neto: **500ml**
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WALKER es un insecticida estomacal de acción sistémica y de contacto. Está formado por la mezcla de dos ingredientes activos, altamente efectivos y complementarios, utilizándose en el tratamiento de semillas.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

WALKER se aplica mediante impregnación directamente a las semillas antes de ser sembradas. De acuerdo a la cantidad de semillas a sembrar, disolver en una pequeña cantidad de agua, revolver hasta obtener una distribución uniforme, dejar secar bajo la sombra y proceder a la siembra.
Evite guardar semilla tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis (ml/kg semilla)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	12	65	0.1* - 0.2**

PC : Período de carencia LMR: Limite máximo de residuos
*:Imidacloprid **: Thiodicarb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

WALKER se aplica una sola vez antes de la siembra de la semilla.

PERIODO DE REINGRESO

Al tratarse de un producto para el tratamiento de semillas, se puede ingresar al campo inmediatamente después de la siembra.

COMPATIBILIDAD

WALKER se aplica solo.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

