35.0 cm

20.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado, y en su envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS.
Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos. Consultar a un médico inmediatamente
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca al vómito si el paciente esta inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.
- Antídoto: Se debe usar Sulfato de atropina para el tratamiento. No utilice morfina.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4,
FITOCORP SAC: 016522183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas, peces y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SAKE 240 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Oxamyl ..... 240 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N°147 Interior 2B Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulador:
KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED
Unit 905 Workingberg Comercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong, China.

Importador y Distribuidor:

FitoCorp

Contenido Neto: 1 L
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SAKE 240 SL es un nematicida que actúa por acción sistémica y también por contacto.
SAKE 240 SL puede ser aplicado directamente al follaje o a la superficie del suelo.
Se emplea diluido en agua. Preparar una Pre mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verterla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.
Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil	L/Ha		
Vid	Nemátodo del Nudo	*Meloidogyne incognita*	4	-	7	0.01
Alcachofa	Nemátodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	1	-	84	0.01
Holantao	Nemátodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	1	-	14	0.01
Pimiento	Nemátodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	1	3	14	2.00

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una sola aplicación por campaña cuando se observe los primeros síntomas de daño en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas; excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.