

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Organofosphates

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiere, recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta.
- Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antidoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106, AGROLAC ANDINA S.A.C. 01- 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FOSELAC 80 WP, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo. Su acción es bloquear la esporulación del hongo e impide la formación de esporangios, ooesporas, esporangiosporos y clamidosporas, afecta el metabolismo energético del hongo, disminuyendo la respiración y producción de ATP.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

FOSELAC 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización.

Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

FOSELAC 80 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

01 aplicación/campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año en los momentos de mayor actividad vegetativa, para el cultivo de vid.

02 aplicaciones/ campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año, en la etapa de desarrollo de hojas para el cultivo de palto.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresa al área tratada después de 24 horas de aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		Dosis (Kg/200 L)	Dosis (Kg/ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	1.05	21	100
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamoni</i>	0.5	4.5	15	50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FOSELAC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - (WP)

Composición:

Fosetyl-Aluminio 800 g/Kg

Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N°1996 - SENASA

Titular de Registro:

AGROLAC ANDINA S.A.C

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por: SINON CORPORATION

101, Nanrong Road, Ta –Tu District, Taichung, Taiwan, R.O.C. Tel:

886-4-2693-3841 / FAX: 886-4-2693-4884

Webpage: <http://www.sinon.com>

Email: service@sinon.com

Importado y Distribuido por:

AGROLAC ANDINA S.A.C

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Contenido Neto: **25 Kg**

N° de Lote.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Organofosphosphate

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiere, recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta.
- Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antidoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106, AGROLAC ANDINA S.A.C. 01- 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FOSELAC 80 WP, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo. Su acción es bloquear la esporulación del hongo e impide la formación de esporangios, ooesporas, esporangiosporos y clamidosporas, afecta el metabolismo energético del hongo, disminuyendo la respiración y producción de ATP.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

FOSELAC 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización.

Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

FOSELAC 80 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

01 aplicación/campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año en los momentos de mayor actividad vegetativa, para el cultivo de vid.
 02 aplicaciones/ campaña, teniendo en cuenta 1 campaña al año, en la etapa de desarrollo de hojas para el cultivo de palto.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresa al área tratada después de 24 horas de aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plaga		Dosis (Kg/200 L)	Dosis (Kg/ha)	P C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	1.05	21	100
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamoni</i>	0.5	4.5	15	50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FOSELAC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - (WP)

Composición:

Fosetyl-Aluminio 800 g/Kg

Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N°1996 - SENASA

Titular de Registro:

AGROLAC ANDINA S.A.C

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Formulado por: SINON CORPORATION

101, Nanrong Road, Ta –Tu District, Taichung, Taiwan, R.O.C. Tel:

886-4-2693-3841 / FAX: 886-4-2693-4884

Webage: <http://www.sinon.com>

Email: service@sinon.com

Importado y Distribuido por:

AGROLAC ANDINA S.A.C

Jiron Sáenz Peña 344 – 105 Magdalena del Mar Lima - Perú

Teléfono: (01) 363-8659

Contenido Neto: **1 Kg**

N° de Lote.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

